



Procedimiento

PARCHE DE CAPSAICINA

¿Qué es el parche de capsaicina?

El parche de capsaicina 8%, actúa sobre las células nerviosas de la piel asociadas al dolor, disminuyendo su acción.

Está indicado para el tratamiento del dolor neuropático periférico en adultos.

¿Cómo se realiza el procedimiento?

Es un procedimiento de carácter ambulatorio, realizado por un médico especialista.

El parche cutáneo se debe aplicar en las zonas cutáneas más dolorosas.

El profesional delimitará la zona dolorosa con un lápiz.

El parche se deja actuar entre 30 y 60 minutos en la zona a tratar.

Luego se realiza el retiro del parche, se aplica un gel y se limpia la piel.



Duración:
Entre 30 y 60 minutos
en la zona a tratar.



Consideraciones:

No debe tocar el parche una vez colocado.

El parche de Capsaicina puede provocar los siguientes signos y síntomas de carácter transitorio:

- Eritema (enrojecimiento de la zona donde se coloca el parche).
- Sensación de quemazón y comezón.
- Irritación y dolor ocular.
- Tos.

En caso necesario, se cortará el pelo de la zona afectada para mejorar la adherencia del parche.

PREVIO AL PROCEDIMIENTO:

- Consentimiento informado firmado.
- Idealmente presentarse antes de la hora agendada, para llevar a cabo una buena preparación.
- Asistir con ropa cómoda.
- Piel aseada.



ANTE CUALQUIER DUDA CON **RESPECTO AL PROCEDIMIENTO**, REALIZAR CONSULTAS A:

EQUIPO DE ENFERMERÍA



+569 7632 0518

MEDIFIS.CL